

薬効・薬価リスト令和5年版 追補
(令和5年8月8日告示・9日適用)

内 用 薬

先 シュンレンカ錠 300mg 300mg1錠 94,814.20
(ギリアド) 6250053F1028/622945801

6250i 抗ウイルス化学療法剤 レナカパビルナトリウム

適応 多剤耐性 HIV-1 感染症。

注) ①次のいずれも満たす患者に投与/過去の治療において本剤を含まない既存の抗レトロウイルス療法による適切な治療を行ってもウイルス学的抑制が得られなかった患者,薬剤耐性検査(遺伝子型解析あるいは表現型解析)を実施し本剤を含まない複数の抗 HIV 薬に耐性を示す患者。②本剤はレナカパビル注射剤の投与に先立つ経口導入としてのみ使用。

用法 投与 1・2 日目に 1 日 1 回 600mg,8 日目に 1 日 1 回 300mg,経口投与。食事の有無にかかわらず投与可。必ず他の抗 HIV 薬と併用。

注) ①本剤投与開始後 15 日目にレナカパビル注射剤の投与を開始。②レナカパビル注射剤の最終投与日から 28 週間超経過したが,レナカパビルの投与を再開することが医療上適切である場合,本剤の投与 1 日目から再開。

保険性 ①診療報酬明細書等の取扱いにおいては,当該患者の秘密の保護に十分配慮する。②投与開始に当たっては,直近の薬剤耐性検査の実施年月日及び薬剤耐性が認められた全ての抗 HIV 薬の品名を診療報酬明細書の摘要欄に記載(令 5.8.8 保医発 0808 第 1 号)。

禁忌 ①本剤(成分)に過敏症の既往歴②リファンピシン,フェニトイン,フェニトイン・フェノバルビタール,ホスフェニトインナトリウム水和物,カルバマゼピン,アパルタミド,エンザルタミド,ミトタン,セイヨウオトギリソウ (St.John's Wort,セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品,ロミタビドメシル酸塩,メチルエルゴメトリンマレイン酸塩及びエルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリンを投与中 **併禁** ①リファンピシン (リファジン),フェニトイン (アレピアチン),フェニトイン・フェノバルビタール (ヒダントール D・E・F),ホスフェニトインナトリウム水和物 (ホストイン),カルバマゼピン (テグレートール),アパルタミド (アーリーダ),エンザルタミド (イクスタンジ),ミトタン (オベプリム) ②セイヨウオトギリソウ (St.John's Wort,セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品③ロミタビドメシル酸塩 (ジャクスタビッド) ④メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 (パルタン),エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン (クリアミン)

(薬価基準収載日: 令 5.8.9. 投与: 14 日まで)

注 射 薬

先 シュンレンカ皮下注 463.5mg 1.5mL2瓶1組 3,208,604
(ギリアド) 6250410A1025/622945901

6250i 抗ウイルス化学療法剤 レナカパビルナトリウム

適応 多剤耐性 HIV-1 感染症。

注) 次のいずれも満たす患者に投与/過去の治療において本剤を含まない既存の抗レトロウイルス療法による適切な治療を行ってもウイルス学的抑制が得られなかった患者,薬剤耐性検査(遺伝子型解析あるいは表現型解析)を実施し本剤を含まない複数の抗 HIV 薬に耐性を示す患者,本剤投与前にレナカパビル経口剤を投与しレナカパビルに対する忍容性が確認された患者。

用法 レナカパビル経口剤の投与開始後 15 日目に 927mg(2 瓶),皮下注。以降は 6 ヶ月に 1 回 927mg,皮下注。必ず他の抗 HIV 薬と併用。

注) ①2 回目以降の投与は,投与予定日(本剤の最終投与日から 26 週間)の前 2 週間以内に行う。②本剤の最終投与日から 28 週間超経過したが,本剤投与を再開することが医療上適切である場合,レナカパビル経口剤の投与 1 日目から再開。

保険性 ①診療報酬明細書等の取扱いにおいては,当該患者の秘密の保護に十分配慮する。②投与開始に当たっては,直近の薬剤耐性検査の実施年月日及び薬剤耐性が認められた全ての抗 HIV 薬の品名を診療報酬明細書の摘要欄に記載(令 5.8.8 保医発 0808 第 1 号)。

禁忌 ①本剤(成分)に過敏症の既往歴②リファンピシン,フェニトイン,フェニトイン・フェノバルビタール,ホスフェニトインナトリウム水和物,カルバマゼピン,アパルタミド,エンザルタミド,ミトタン,セイヨウオトギリソウ (St.John's Wort,セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品,ロミタビドメシル酸塩,メチルエルゴメトリンマレイン酸塩及びエルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリンを投与中 **併禁** ①リファンピシン (リファジン),フェニトイン (アレピアチン),フェニトイン・フェノバルビタール (ヒダントール D・E・F),ホスフェニトインナトリウム水和物 (ホストイン),カルバマゼピン (テグレートール),アパルタミド (アーリーダ),エンザルタミド (イクスタンジ),ミトタン (オベプリム) ②セイヨウオトギリソウ (St.John's Wort,セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品③ロミタビドメシル酸塩 (ジャクスタビッド) ④メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 (パルタン),エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン (クリアミン)